

# Scala di valutazione AOFAS per l' ALLUCE

versione italiana validata da Leigheb et al.\*

| <b>I Dolore</b> (max 40 punti) | Punteggio |
|--------------------------------|-----------|
| Nessuno                        | 40        |
| Lieve, occasionale             | 30        |
| Moderato, quotidiano           | 20        |
| Severo, quasi sempre presente  | 0         |

## **II Funzione** (max 45 punti)

| <i>Limitazioni nelle attività quotidiane, lavorative e ricreative</i> |    |
|---|----|
| Nessuna   | 10 |
| Lieve   | 7  |
| Moderata  | 4  |
| Severa  | 0  |

| <i>Requisiti per le calzature</i>                             |    |
|---|----|
| Scarpe alla moda, comuni, senza necessità di plantari/solette | 10 |
| Calzature comode, plantari/solette                            | 5  |
| Scarpe modificate o tutore ortopedico                         | 0  |

| <i>Articolarità MF (dorsiflessione più plantarflexione)</i> |    |
|---|----|
| Normale o lieve limitazione (75° o più)                     | 10 |
| Limitazione moderata (30°-74°)                              | 5  |
| Limitazione severa (meno di 30°)                            | 0  |

| <i>Articolarità IF (plantarflexione)</i> |   |
|--|---|
| Nessuna limitazione                      | 5 |
| Severa limitazione (meno di 10°)         | 0 |

| <i>Stabilità MF-IF (tutte le direzioni)</i> |   |
|---|---|
| Stabile                                     | 5 |
| Decisamente instabile o lussabile           | 0 |

| <i>Callo relativo a MF-IF dell'alluce</i> |   |
|---|---|
| Nessun callo o callo asintomatico         | 5 |
| Callo sintomatico                         | 0 |

## **III Allineamento** (max 15 punti)

|  |    |
|--|----|
| Buono, alluce ben allineato  | 15 |
| Discreto, osservato qualche grado di malallineamento dell'alluce, asintomatico | 8  |
| Scarso, evidente malallineamento sintomatico                                   | 0  |

**Cognome e nome pz:**

**Lato:** Dx Sin

**Data compilazione:**

**Totale:** /100